

# Pohánka

## HARPE

Felhasználását tekintve zöldítésre kiválóan alkalmas, másodvetésben 100–140 napot igényel a mag beérleléséhez és 60 napot tekintélyes zöldtömeg kifejlesztéséhez. Nagy előnye, hogy – szemben a mustárral – nem rokona egyik előtte vagy utána következő termesztett fajnak sem, ezért a többi kultúrát veszélyeztető károsítói jelenleg nincsenek.

### Agronómiai tulajdonságai

A talajra igénytelen, ha a kelés jó volt, nagy zöldtömeget fejleszt, mire eljön a beforgatás ideje. Hagyhatjuk kifagyni is, ha belvízre nem hajlamos, tavasszal könnyen művelhető a vetett tábla. A vetéstől számítva a 45. naptól hosszan virágzik (ősszel is), ugyanakkor a mag a 75. naptól érésnek indulhat. A pohánka agresszív növény, ezért, ha a magját leforgatjuk, akkor hosszú évek múlva is gyomosítani fogja a táblát!

### Erősségei

- Nagyon gyors kelésű kiugróan jó kezdeti fejlődésű jó gyomelnyomó képességű fajta
- Rövid tenyészidejű, ezért alkalmas másodvetésre, de főnövényként is termeszthető
- Kitűnő elővetemény akár tavaszi akár őszi vetésű növények elé
- Hosszan virágzik, de a fagyokra nagyon érzékeny
- Vetése apró morzsás, jól előkészített magágyba történjen
- Alacsony költségigényű, gazdaságosan termelhető növény
- Jól beilleszthető az ökológiai gazdálkodás rendszerébe is
- Kitűnő zöldtrágya növény mely segít a talajban lakó kártevők gyérítésében is

